

SEMESTRAL
UNI




TRIGONOMETRÍA

Tema: Transformación de
coordenadas

TRASLACIÓN DE EJES COORDENADOS

Si trasladamos el origen $O(0,0)$ hacia el nuevo origen $O'(h,k)$



Entonces las ecuaciones de traslación son

$$\begin{aligned}x &= x' + h \\ y &= y' + k\end{aligned}$$

Ejemplo

Determine la nueva ecuación de la parábola $x^2 - 2x - 4y = 3$ luego que el sistema se traslade al vértice de la parábola

Resolución

Reducimos la ecuación de la parábola

$$x^2 - 2x + 1 = 4y + 3 + 1$$

$$(x - 1)^2 = 4(y + 1) \dots (*)$$

Si trasladamos el nuevo origen al vértice entonces

$$(h, k) = (1, -1)$$

$$\Rightarrow x = x' + 1$$


$$\Rightarrow y = y' - 1$$

Reemplazando en la ecuación (*)

$$(x')^2 = 4(y')$$

ROTACIÓN DE EJES COORDENADOS

Si los ejes coordenados giran un ángulo de θ alrededor del origen O



Entonces las ecuaciones de rotación son

$$\begin{aligned}x &= x' \cos \theta - y' \operatorname{sen} \theta \\ y &= x' \operatorname{sen} \theta + y' \cos \theta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x' &= x \cos \theta + y \operatorname{sen} \theta \\ y' &= -x \operatorname{sen} \theta + y \cos \theta\end{aligned}$$

Problema UNI 2018-2

Dado el punto $P = (-2, \sqrt{3})$, determine las nuevas coordenadas del punto luego de que los ejes coordenados giran un ángulo de 30° en sentido antihorario.

A) $\left(-\sqrt{3}, \frac{1}{2}\right)$ B) $\left(-2\sqrt{3}, \frac{5}{2}\right)$ C) $\left(-\sqrt{3}, \frac{7}{2}\right)$

D) $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ E) $\left(-\sqrt{3}, \frac{1}{2}\right)$

$$\begin{aligned}x' &= x\cos\theta + y\sin\theta \\y' &= -x\sin\theta + y\cos\theta\end{aligned}$$

Resolución

Nos piden las nuevas coordenadas: $P'(x', y')$

Con los datos y las ecuaciones de rotación

$$x' = (-2)\cos 30^\circ + \sqrt{3}\sin 30^\circ$$

$$y' = -(-2)\sin 30^\circ + \sqrt{3}\cos 30^\circ$$

Entonces

$$x' = -\frac{\sqrt{3}}{2} ; y' = \frac{5}{2}$$

$$P' = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

ELIMINACIÓN DEL TERMINO XY

Teorema:

La ecuación general de segundo grado

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

En donde $B \neq 0$ puede transformarse siempre en otra de la forma

$$A'x'^2 + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0$$

Haciendo girar los ejes coordenados un ángulo α tal que

$$\cot(2\alpha) = \frac{A-C}{B}$$

Problema

Mediante una rotación de ejes, elimine el termino "xy" e indique que tipo de cónica es

$$x^2 + 4xy + y^2 = 6$$

Resolución

1) Ángulo de rotación θ

$$\cot 2\theta = \frac{1-1}{4} = 0$$

$$\rightarrow \theta = 45^\circ$$

2) Aplicando las formulas de Rotación

$$x = x' \cos \theta - y' \sin \theta$$

$$y = x' \sin \theta + y' \cos \theta$$

$$x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}$$

$$y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}$$

3) Ahora reemplazando en la ecuación de 2do grado

$$x^2 + 4xy + y^2 = 6$$

$$\left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}}\right)^2 + 4\left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}}\right) + \left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}}\right)^2 = 6$$

Entonces

$$\therefore 3(x')^2 - (y')^2 = 6$$

— ACADEMIA —

CÉSAR

VALLEJO

GRACIAS

SÍGUENOS:   

academiacesarvallejo.edu.pe